

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SINT CAROLUS
PROGRAM S1 KEPERAWATAN

Laporan Penelitian

Juli 2018

Irena Katrin

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN
IKTERUS NEONATUS FISILOGIS DI KAMAR BAYI RUMAH SAKIT
PONDOK INDAH

xii + 60 Halaman, 1 Skema, 13 Tabel, 8 Lampiran

ABSTRAK

Ikterus neonatus fisiologi adalah kejadian menguning pada kulit bayi yang muncul pada hari ke-3 atau dalam satu minggu pertama. Tujuan penelitian adalah mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ikterus neonatus fisiologis pada bayi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan metode restrospektif dan korelasional untuk mencari hubungan antara faktor-faktor yang terkait dengan kejadian ikterus, melalui data yang dikumpulkan. Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2017 - Juli 2018. Metode pengumpulan data berdasarkan rekam medis dari 302 bayi yang lahir di Rumah Sakit Pondok Indah dengan uji statistik *Kendall's tau-b*, *Kendall's Tau-c* dan *Chi Square*, diperoleh hasil penelitian ada hubungan antara frekuensi menyusui (0,019), perubahan BB (0,002), jenis persalinan (0,009), maturitas (0,011) dengan kejadian ikterus neonatus fisiologis. Terdapat juga diperoleh hasil penelitian tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian ikterus neonatus fisiologi (p-value : 0,908). Diharapkan pihak RS. Pondok Indah memberikan edukasi pada ibu di fase antenatal care mengenai kelahiran premature, proses persalinan secara buatan (SC, Forcep, Vakum) memiliki faktor resiko untuk terjadinya ikterus dan ibu post partum mengenai manajemen laktasi, posisi menyusui, maupun perlekatan menyusui yang efektif termasuk frekuensi menyusui terhadap upaya pencegahan kejadian ikterus neonatus fisiologis di kamar bayi Rumah Sakit Pondok Indah. neonatus fisiologis.

Daftar Pustaka : 15 Buku, 20 Jurnal, 5 Web (Tahun 2010-2017)

Kata Kunci : Ikterus, Neonatus, Fisiologis

SINT CAROLUS SCHOOL OF HEALTH SCIENCE

S-1 NURSING PROGRAM

Research Report

Juli 2018

Irena Katrin

FACTORS IN CORRELATION WITH CASES OF PHYSIOLOGIC NEONATAL JAUNDICE AT NURSERY OF PI HOSPITAL

xii + 60 page, 1 Picture of skema, 13 Table, 8 attachment

ABSTRACT

Physiologic neonatal jaundice is a yellowing occurrence in infant skin that appears on day 3 or within the first week. The objective of the study was to determine the factors correlated with neonatal infant jaundice. This research is a quantitative research, with retrospective and correlational method through the data collected. The study was conducted between December 2017 until July 2018. Data collection method was based on medical record of 302 babies born at Pondok Indah Hospital with statistical tests of Chi Square, revealing that there is correlation between frequency of breastfeeding (0,019), change of body weight (0,002), type of labor (0,009), maturity (0,011) with physiologic neonatal jaundice. However, there is no correlation between sex with physiologic neonatal jaundice (0,098). It is expected that PI Hospital provide education to mothers during the phase of antenatal care on premature delivery, unnatural birth processes (SC, Forcep, Vacuum) possess risk factors for jaundice to occur and of post partum on lactation management, breastfeeding position and effective breastfeeding toward preventing physiologic neonatal jaundice in the nursery, Pondok Indah Hospital.

References : 16 Books, 20 Journals, 5 Web (Years 2010-2017)

Keywords : Jaundice, Neonatal, Physiologic